

Scoring Child-EDE-Q (aangepaste versie Jansen,
Mulkens & Jansen, 2007)

Overzicht items en subschalen:

Nr	Subschaal en item
	<i>Lijnen (L)</i>
1	Beperking van de voedselinname
2	Vermijding van voedselinname
3	Vermijding van voedingsmiddelen
4	Dieetregels
5	Lege maag
	<i>Piekeren over eten (E)</i>
6	Preoccupatie met voedsel, eten, of calorieën
7	Angst om de controle over de voedselinname te verliezen
9	Heimelijk eten
15	Schuldgevoelens over eten
28	Sociaal eten
	<i>Piekeren over gewicht (G)</i>
11	Preoccupatie met lichaamsvormen of gewicht
14	Wens om gewicht te verliezen
23	Belang van gewicht
25	Reactie op voorgeschreven wegen
26	Ontevredenheid met gewicht
	<i>Piekeren over lichaamsvormen (LV)</i>
10	Platte buik
11	Preoccupatie met lichaamsvormen of gewicht
12	Angst om in gewicht toe te nemen
13	Zich dik voelen
24	Belang van lichaamsvormen
27	Ontevredenheid met lichaamsvormen
29	Ongenoegen bij het zien van het eigen lichaam
30	Vermijding van blootstelling

Eetbuien & gewichtscontrolemaatregelen

- 16,17 Objectieve eetbuien
 18 Subjectieve eetbuien
 19 Zelfopgewekt braken
 20 Misbruik van laxantia
 21 Misbruik van diuretica
 22 Intensieve lichamelijke inspanning om lichaamsvormen of gewicht te controleren

Scoring

Omdat de invulmethode van de Child-EDE-Q werd aangepast (Jansen, Mulkens & Jansen, 2007), zullen een aantal items moeten worden omgescoord. Een deel van de items wordt gescoord van 0 tot en met 28 (correspondeert met aantal dagen in 4 weken). Het omscoren van de betreffende items (1,2,3,4,5,6,9, 10,11,12,13,14,) gaat als volgt;

Ingevuld door kind	Omscoren naar
0	0
1-5	1
6-12	2
13-15	3
16-22	4
23-27	5
28	6

Uiteindelijk worden alle items dus op een zevenpuntsschaal (0-6) gescoord. Die schaal heeft, afhankelijk van het item, betrekking op de ernst of de frequentie van het kenmerk, waarbij 0 naar de afwezigheid van het kenmerk verwijst en 6 naar een kenmerk dat aanwezig is en zeer ernstig is of zeer frequent optreedt. De score 1 tot en met 5 wordt gebruikt voor tussenliggende gradaties.

Als een respondent aangeeft dat het moeilijk is om te kiezen tussen twee scores wordt de respondent geadviseerd om te kiezen voor de laagste, dat wil

Als een item niet ingevuld is (missing value) wordt dit item niet bij de uiteindelijke berekeningen betrokken.

Na afname van de Child-EDE-Q kunnen er een totaalscore, vier subschaalscores, alsmede scores op de zes losse items berekend worden. De scores op de losse items geven informatie over de eetbuien en het compensatiegedrag.

De subschalen geven informatie over het lijngedrag en het piekeren over respectievelijk eten, lichaamsvormen en gewicht. Per subschaal worden de scores van de bijbehorende items opgeteld en deze somscore wordt gedeeld door het aantal items van deze subschaal. Voor een betrouwbare subschaalscore moet ten minste de helft + 1 van de items gescoord zijn.

De totaalscore wordt berekend door de berekende subschaalscores op te tellen en deze somscore te delen door het aantal subschalen.

Voor een betrouwbare totaalscore moeten minimaal drie van de vier subschaalscores berekend zijn.